


OÏDIUM

ARMICARB® peut être utilisé en préventif sur oïdium, ou positionné en « effet stop » sur oïdium déclaré.

1 POSITIONNEMENT PRÉVENTIF

Insérer ARMICARB® dans vos programmes en alternance avec d'autres spécialités.
Renouveler la protection 8 à 10 jours après traitement.

◀ ARMICARB® 3KG + SOUFRE MOUILLABLE 80% 2KG ▶




En cas de cumul de pluie > 20 mm, renouveler la protection.

En début de cycle, la dose d'ARMICARB® peut être optimisée sous réserve d'une pulvérisation de bonne qualité et dirigée sur la végétation présente. Consultez à cet effet votre conseiller technique.

2 POSITIONNEMENT "EFFET STOP"

Sur oïdium déclaré, travailler ARMICARB® en association avec une spécialité à base de soufre mouillable de 3 à 6 kg/ha. L'idéal est de faire 2 traitements en adaptant le renouvellement en fonction de l'oïdium présent.

◀ ARMICARB® 3KG + SOUFRE MOUILLABLE 80% 3 À 6KG ▶



RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

ARMICARB® peut être utilisé en agricultures conventionnelle, biologique et biodynamique.
Évitez les traitements ARMICARB® pendant la floraison de la vigne. Dans le cas de 2 applications successives dans un programme, respecter un délai minimum de 8 jours entre les 2 interventions ARMICARB®.

Compatibilités

ARMICARB® ne doit pas être mélangé : à des formulations EC, à des formulations au pH acide, à des fertilisants foliaires ni à des spécialités à base d'oxychlorure de cuivre ou oxyde cuivreux. Demander conseil à votre interlocuteur DE SANGOSSE pour toute question. Il est conseillé de verser ARMICARB® très lentement dans la cuve, ou de le pré-diluer et de le verser en fin de remplissage en respectant une concentration maximum de 15 % pour que la pré-dilution soit efficace.



N°AMM	2110059
HOMOLOGATIONS	Oïdium et botrytis vigne
COMPOSITION	850 g/kg de bicarbonate de potassium + coformulants
FORMULATION	Poudre soluble dans l'eau (SP)
DOSE PRÉCONISÉE	3 kg/ha (en dirigé sur les grappes pour l'usage botrytis)
CLASSEMENT	Sans classement toxicologique ou écotoxicologique
DAR	1 jour
ZNT	5 m des points d'eau
DRE	6h en plein champ
LMR	Exempt

Fiche de sécurité ARMICARB® disponible en consultant le site : www.desangosse.fr ou www.quickfds.com
ARMICARB® - AMM N° 2110059 - Composition : 850 g/kg de bicarbonate de potassium - Formulation SP : poudre soluble dans l'eau. ©Marque déposée de Church & Dwight Autorisé en Agriculture Biologique - SCALA® - AMM n° 9200159 - 400 g/l pyriméthanil - BBCH 60 à 89 (mai à septembre) - Classement : Attention, H411 Nombre d'application : 1 ©Marque déposée BASF Agro - Pour les usages autorisés, doses, conditions, restrictions d'emploi, se référer impérativement à l'étiquette et respecter strictement les préconisations. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. Consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto> - DE SANGOSSE - Bonnel - CS 10005 - 47480 Pont-du-Casse - Tél. : 05 53 69 36 30 - www.desangosse.fr - Agrément n°A001561 pour la distribution de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel S.A.S. au capital de 9828225 euros - 300 163 896 RCS Agen N° TVA intracommunautaire FR 57300163896. Edition Novembre 2017 - Annule et remplace l'édition précédente - Crédit photos DE SANGOSSE/ Shutterstock.

DE SANGOSSE

FONGICIDE ANTI OÏDIUM ET ANTI BOTRYTIS

TOUT EST EN RÈGLE
POUR STOPPER ET PRÉVENIR
LES MALADIES



ARMICARB®

#PositiveProduction™

DE SANGOSSE

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.




ARMICARB®

PRÉVENIR ET STOPPER !

DES VERTUS DÉCUPLÉES GRÂCE À UNE FORMULATION EXCLUSIVE

- ✓ Efficace et homologué sur oïdium et botrytis.
- ✓ Une solution de biocontrôle utilisable en Agriculture Biologique. Figure sur la liste officielle des produits de biocontrôle.
- ✓ Préventif et stoppant : Une réponse technique sur le champignon présent.
- ✓ Pas de résistance connue à ce jour grâce à un mode d'action multisites
- ✓ Un profil moderne en réponse aux attentes sociétales : Applicable jusque 1 jour avant vendanges. Aucune incidence sur la qualité des vins et spiritueux.
- ✓ Pas de limite maximale de résidus.




MODE D'ACTION D'ARMICARB®

Armicarb® a une action de contact multisites sur les champignons pathogènes. Le bicarbonate de potassium, matière active d'Armicarb®, agit sur les cellules fongiques :

- en **perturbant** le pH
- en **augmentant** la pression osmotique
- en **perturbant** l'équilibre des membranes cellulaires.

Ainsi, Armicarb® agit sur les spores et sur le mycélium des pathogènes : il est actif en préventif comme sur maladie déclarée.




BOTRYTIS

POSITIONNEMENT




EFFICACITÉ PROUVÉE SUR BOTRYTIS



MIXTE BOTRYTIS / OIDIUM

Une application Armicarb® autour de fermeture, ciblée pour lutter contre le botrytis, a une efficacité sur l'oïdium

Essai Prestataire (49) - cépage Chardonnay



PROTOCOLE

Couverture oïdium « light » sur toute la parcelle
 Traitement botrytis à BBCH 79 – autour du stade B :
 • TNT
 • Référence
 • Armicarb 3 kg/ha
 Notation oïdium 30/08/2017 - avant vendange

