

CAMBO

Herbicide maïs



CAMBO
PROTECTION
RAPPROCHÉE



PROTECTION RAPPROCHÉE CONTRE LES FLORES D'AUJOURD'HUI



Liseron
des haies



Liseron
des champs



Chardon



Renouée
liseron



Renouée
persicaire



Renouée des
oiseaux



Datura
stramoine



Ambrosie à
feuille d'armoïse

Rapide d'action

Deux modes d'actions hors ALS

Large plage d'utilisation

DE SANGOSSE
inc
protection

La protection est dans notre nature

DE SANGOSSE

DE SANGOSSE - Bonnel - CS 10005 - 47470 Pont-du-Casse - Tél 05 53 69 36 30

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

LES ATOUTS CAMBIO

- **Efficacité reconnue sur vivaces** (liserons, chardon...)
- **Très large spectre** sur dicots difficiles et émergentes : renouée liseron, ambroisie, datura, laiteron, arroche, géraniums...
- **Grande rapidité d'action** : 2 jours sur annuelles et 4 à 6 jours sur vivaces.
- **Solution anti-dicots** hors mode d'action ALS
- **Groupe HRAC - BENTAZONE : C3 - DiCAMBA : 0** pour gérer l'efficacité des herbicides.

Caractéristiques


Composition : BENTAZONE 320 g/l + DICAMBA 90 g/l
Formulation : SL (Concentré Soluble)
Classement et ph. de risque : Attention, H317, H413
Usage : maïs*désherbage (uniquement autorisé sur maïs)
Dose homologuée : 2,5 L/ha (fractionnable en 2 fois à la dose de 1,5L/ha et de 1L/ha)
ZNT : 5 mètres
DAR : Maïs grain : 63 jours ; Maïs ensilage : 28 jours
DRE : 48 heures
Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer plus de 800 g de bentazone/ha/an sur maïs
AMM n°9800477

DESTRUCTION LISERONS



INTERVENIR SUR LISERONS
DE 20-30 CM DE LONG

LE STADE DU MAÏS



Fractionnement possible dans la limite de la dose homologuée : **2,5L/ha/an**

CAMBIO est utilisable sur annuelles et vivaces en traitement dirigé entre les rangs du maïs quel que soit son stade, dans le respect du DAR jusqu'à la dose maximale de 2,5 litres/ha + adjuvant. Dans le cadre de la lutte contre le liseron, il est primordial d'intervenir sur plante bien développée et avant l'apparition des racines coronaires du maïs pour être efficace et sélectif.

SPECTRE D'EFFICACITÉ

	TS Efficacité > 95 %	S 85 % < efficacité < 95 %	MS 70 % < efficacité < 85 %
CLASSIQUES	Amarantes Chénopodes Morelle Renouée persicaire		
DIFFICILES	Abutilon Ambroisie (2) Armoise vulgaire (2) Datura (2) Laiteron Lampourde (2) Renouée liseron	Arroche Fumeterre Ortie royale (2) Renouée des oiseaux	Mercuriale
EMERGENTES	Anthémis des champs Capselle – moutarde – ravenelle Chrysanthème des moissons Coquelicot Gaillet Matricaire Pourpier Spergule des champs	Erodium Euphorbe Geranium Lamier Mouron des champs Renoncule des champs Séneçon commun	Linaire bâtarde Pensée des champs Stellaire
VIVACES	Chardon Liseron des champs (2) Liseron des haies (2)	Ronce (2) Rumex	

- 1) Adjuvant : nous recommandons un adjuvant de type LI 700, ELTON, TRANSIT, ou GONDOR ou SILWET L-77. Nous consulter pour tout autre adjuvant.
- (2) Préférer la double application : 1,5 l/ha puis 1 l/ha



Gestion durable de la Bentazone (recommandations)

Afin de protéger les ressources en eau, **sur les aires de protection de captage d'eau** :

- Éviter d'utiliser sur les sols sensibles aux transferts : sols superficiels ou zones de nappe peu profonde
- Éviter d'utiliser sur sols où la teneur en matière organique < 1,7%

DE SANGOSSE

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.