

ENGRAIS CE - Solution d'engrais NPK 7-4-4 contient des oligoéléments

COMPOSITION

Azote (N) : 91 g/L	Manganèse (Mn) : 0,5 g/L
Phosphore (P₂O₅) : 55 g/L	Molybdène (Mo) : 0,05 g/L
Potassium (K₂O) : 55 g/L	Zinc (Zn) : 0,4 g/L
Magnésium (MgO) : 3 g/L	
Bore (B) : 0,5 g/L	
Cuivre (Cu) : 0,14 g/L	
Fer (Fe) : 0,3 g/L	

CARACTÉRISTIQUES

Formulation	Adjuvant ENAM : Extraits Naturels d'Algues Marines
Utilisation	Foliaire
Conditionnement	10 L
Conditions de stockage	A conserver dans un endroit frais et sec. A protéger contre le gel et autres températures extrêmes (températures supérieures à 40°C).
Conservation du produit	24 mois
Forme	Liquide (SL)
Densité	1.175

INTÉRÊTS AGRONOMIQUES

Rôles des éléments

Complétude : apport combiné d'Azote, Phosphore, Potassium, Magnésium et Oligo-éléments indispensables au bon déroulement de la culture. Cet équilibre nutritionnel permet à la plante de répondre à la bio-stimulation des algues. La proportion de chaque élément est spécifique aux besoins de la plante permettant ainsi une amélioration du statut nutritionnel global de la plante. L'équilibre en oligo-éléments est proche de celui de la sève des plantes. Les oligo-éléments sont pour la plupart sous une forme chélatée augmentant leur taux d'absorption, d'assimilabilité et leur circulation dans la plante.

Caractéristiques

INO-ALG NPK est une formulation originale qui associe des extraits naturels d'algues marines à un équilibre minéral complet, spécifique et de haute solubilité. C'est un produit polyvalent qui convient à de nombreuses cultures. Il est spécifiquement adapté à la nutrition, la stimulation et à la croissance du système végétatif.

INO-ALG NPK améliore le statut nutritionnel de la culture. Utilisé en pulvérisation foliaire, il active le métabolisme de chaque cellule végétale. Cette action sur l'ensemble de la plante améliore la photosynthèse et la capacité de prélèvement des éléments minéraux par le système racinaire.

Intérêts de la formulation

Famille : Algues brunes - Espèce : Ascophyllum Nodosum
Extraction à froid, procédé naturel. On puise les substances de l'algue en respectant l'équilibre naturel de sa composition.
Propriétés adjuvantes des algues :
- Mouillabilité (étalement)
- Adhésivité (résistance au lessivage et les matières actives sont maintenues plus longtemps sur le lieu d'assimilation)
- Humectante (ralentit l'évaporation de l'eau à la surface de la feuille et évite les cristallisations)
- Taux d'absorption proche de 80 à 90 %

MODE D'EMPLOI

APPLICATION FOLIAIRE

- Dose générale : 5 L/ha - Concentration maximale : 5% (5L pour 100L d'eau)
- > ARBRES FRUITIERS, AGRUMES, PEPINIERES - Stade : 4 applications dès chute des pétales puis tous les 15 jours
 - > VIGNE - Stade : Grappes séparées - Début floraison - Nouaison puis tous les 15 jours
 - > CULTURES LEGUMIERES - Stade : 3 à 4 applications tous les 15 jours dès le démarrage végétatif
 - > CEREALES A PAILLES - Dose 3 L/ha - Stade : de la montaison au gonflement - de sortie dernière feuille à début épiaison
 - > OLEO-PROTEAGINEUX - Dose 3 L/ha - Stade : 5-10 cm - début floraison - gousses plates
 - > POMME DE TERRE (plant, consommation, féculé) - Stade : 3-4 applications de début tubérisation puis tous les 15 jours
 - > MAÏS, COLZA, BETTERAVES ... - Stade : en conditions difficiles ou dès le démarrage

Pour les cultures sous abri, procéder à un test préalable à la concentration de 2,5% pour observer le comportement de la végétation.

CONSEILS PRATIQUES D'UTILISATION

Pour une efficacité optimale, utiliser un volume d'eau/ha suffisant pour obtenir une répartition homogène sur le feuillage. Préférer les traitements aux températures entre 6 et 25°C. Evitez les applications en cas de sécheresse, d'humidité importante, de gel, de pluie ou lorsque ces conditions sont attendues. Agiter le bidon pour homogénéisation. Verser progressivement le produit à travers un filtre, une fois la cuve à moitié remplie d'eau et le système d'agitation en marche. Maintenir l'agitation pendant toute la durée de l'application. Rincer l'emballage deux fois et nettoyez tous les équipements avant et après utilisation.

MELANGE / CO-APPLICATION : Lire attentivement toutes les étiquettes et se conformer au mode d'emploi ainsi qu'aux recommandations sur les produits devant être co-appliqués ou non. Certains paramètres, extérieurs au contrôle du fabricant ou du distributeur, peuvent avoir des répercussions sur les performances des produits co-appliqués. Par conséquent, la co-application est réalisée aux risques et périls de l'utilisateur final. En cas de mélange avec d'autres produits, effectuer toujours un test préalable et incorporer ce produit en dernier. Vous pouvez également contacter le fabricant ou le distributeur pour obtenir des conseils

DANGER - Contient ETHYLENEDIAMINETETRAACETATE-DE-TETRASODIUM - H318 :
Provoque des lésions oculaires graves



IMPORTANT : Respecter les usages, doses, conditions et précautions d'emploi mentionnés sur l'emballage qui ont été déterminés en fonction des caractéristiques du produit et des applications pour lesquelles il est préconisé. Conduire sur ces bases, la culture et les traitements selon la bonne pratique agricole en tenant compte, sous votre responsabilité, de tous facteurs particuliers concernant votre exploitation, telles que la nature du sol, les conditions météorologiques, les méthodes culturales, les variétés végétales, la résistance des espèces... Le fabricant garantit la qualité et la conservation de ses produits, vendus dans leur emballage d'origine sur la durée mentionnée sur les fiches techniques. Il garantit leur conformité à la formule indiquée sur l'emballage et à la réglementation en vigueur.