



## L'EFFICACITÉ À TOUTE ÉPREUVE



FORTE APPÉTENCE



EFFICACITÉ PROUVÉE



FABRIQUÉ EN FRANCE


Découvrez  
IT PROCESS  
en vidéo



Le processus de fabrication de  
LIPHATECH

### FORTE APPÉTENCE

Céréales de haute qualité. Forme étudiée avec plusieurs angles d'attaque pour une meilleure consommation par les rongeurs



### PROTECTION LONGUE DUREE

TRES RESISTANT À L'HUMIDITÉ

## LA SOLUTION POUR LUTTER

- ▶ Contre les Souris
- ▶ Autour des bâtiments, idéal en lieux humides
- ▶ Utilisable également aux abords des infrastructures

## LE PRODUIT



RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT	GENCOD	PEREMPTION	PAL
80034822	seau de 5 kg	3495694018221	3 ans	50 seaux



Utilisation obligatoire en POSTE D'APPÂTAGE

## CONSEILS - BONNES PRATIQUES



### AVANT LE TRAITEMENT : rendre inaccessibles les sources de nourriture



### MISE EN PLACE DU TRAITEMENT



- Bien lire les indications et instructions sur les étiquettes du produit avant utilisation
- Placer les appâts dans des **postes d'appâtage sécurisés**
- Ne pas poser le poste d'appâtage dans un angle afin que le rongeur puisse toujours voir la sortie.
- Positionner les postes d'appâtage au **plus près des indices de présences** (crottes, traces de passage...)



- 1 Le rongeur entre dans le poste d'appâtage.
- 2 Il consomme l'appât.
- 3 Il ressort et succombe 4 à 10 jours plus tard.



- Faire « **une ceinture de protection** » avec les postes, autour des bâtiments pour éviter que les rongeurs pénètrent à l'intérieur.

### SUIVI DU TRAITEMENT



- Inspecter les postes d'appâtage au minimum tous les 2 à 3 jours si présence de souris et tous les 5 à 7 jours si présence de rats après le début du traitement, puis une fois par semaine tant que les appâts sont consommés.
- Recharger les postes d'appâtage avec la quantité d'appâts nécessaire dans le respect des doses d'emploi autorisées.



- Il est primordial de veiller à la **disponibilité de l'appât** (le bon produit à la bonne dose au bon endroit) de façon à cibler toute la population.

### VIGILANCE ET OBSERVATION POUR EVITER TOUTE NOUVELLE INFESTATION



- Eliminer les refuges, couper les végétaux sur une largeur d'un mètre autour des bâtiments, tailler les arbres
- Enlever tout ce qui peut servir d'abri potentiel
- Faire les travaux nécessaires pour empêcher l'entrée et l'installation des rongeurs



Le port des gants est obligatoire à chaque étape du traitement.



Se laver les mains après chaque manipulation.

▶ [retrouvez tous nos tutos et vidéos sur BIAGRO.FR](https://www.biagro.fr)

#### MENTIONS RÉGLEMENTAIRES :

Nom homologué : FRAP® BLOCK®- AMM N°FR-2012-0499 - Diféthialone à 25mg/kg - N° CAS 104653-34-1. CLASSEMENT : Toxicité spécifique pour certains organes cibles. Exposition répétée (catégorie 2), Danger pour le milieu aquatique - Toxicité chronique (catégorie 3)  
PRODUIT RODONTICIDE RÉSERVE AUX PROFESSIONNELS. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.