



QUALITÉ UNIQUE SUR LE MARCHÉ POUR UNE EFFICACITÉ GARANTIE



ACTION RAPIDE



EFFICACITÉ PROUVÉE



FABRIQUÉ EN FRANCE

Découvrez
LE PROCESS
en vidéo



Le processus de fabrication de
LIPHATECH

EXCELLENTE TEXTURE

Grâce à un dosage précis des ingrédients, la pâte est fraîche et non collante.

- Relargage limité des matières grasses
- Excellente tenue dans le temps
- Manipulation propre

RECETTE SPÉCIFIQUE

La pâte comprend notamment des matières grasses d'origine 100% végétale. Ces matières grasses agissent comme exhausteur de goût : elles augmentent l'intensité olfactive gustative de l'appât et le rendent ainsi encore plus appétant.



TOUS LIEUX

Sachet poreux qui laisse diffuser l'odeur céréalière

LA SOLUTION POUR LUTTER

- ▶ Contre les Souris et Rats (Surmulots et Rats noirs)
- ▶ A l'intérieur des bâtiments, en lieux secs ou protégés
- ▶ Sur des sites avec de fortes infestations et forte compétition alimentaire

LE PRODUIT



RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT	GENCOD	PEREMPTION	PAL
80005292	Seau de 5 Kg Sachet de 10g	3495694012922	4 ans	80 seaux
80007555	16 seaux de 5 kg	3495694165550	4 ans	2 box
80031962	Seau de 13 kg Sachet de 10g	3495694019624	4 ans	50 seaux



Utilisation obligatoire en POSTE D'APPÂTAGE

CONSEILS - BONNES PRATIQUES



AVANT LE TRAITEMENT : rendre inaccessibles les sources de nourriture



MISE EN PLACE DU TRAITEMENT



- Bien lire les indications et instructions sur les étiquettes du produit avant utilisation
- Placer les appâts dans des **postes d'appâtage sécurisés**
- Ne pas poser le poste d'appâtage dans un angle afin que le rongeur puisse toujours voir la sortie.
- Positionner les postes d'appâtage au **plus près des indices de présences** (crottes, traces de passage...)



- 1 Le rongeur entre dans le poste d'appâtage.
- 2 Il consomme l'appât.
- 3 Il ressort et succombe 4 à 10 jours plus tard.



- Faire « **une ceinture de protection** » avec les postes, autour des bâtiments pour éviter que les rongeurs pénètrent à l'intérieur.

SUIVI DU TRAITEMENT



- Inspecter les postes d'appâtage au minimum tous les 2 à 3 jours si présence de souris et tous les 5 à 7 jours si présence de rats après le début du traitement, puis une fois par semaine tant que les appâts sont consommés.
- Recharger les postes d'appâtage avec la quantité d'appâts nécessaire dans le respect des doses d'emploi autorisées.



- Il est primordial de veiller à la **disponibilité de l'appât** (le bon produit à la bonne dose au bon endroit) de façon à cibler toute la population.

VIGILANCE ET OBSERVATION POUR EVITER TOUTE NOUVELLE INFESTATION



- Eliminer les refuges, couper les végétaux sur une largeur d'un mètre autour des bâtiments, tailler les arbres
- Enlever tout ce qui peut servir d'abri potentiel
- Faire les travaux nécessaires pour empêcher l'entrée et l'installation des rongeurs



Le port des gants est obligatoire à chaque étape du traitement.



Se laver les mains après chaque manipulation.

[Retrouvez tous nos tutos et vidéos sur BIAGRO.FR](#)

MENTIONS RÉGLEMENTAIRES :

Nom homologué : FRAP® PAT' - AMM N°FR-2012-0500 - Diféthialone à 25mg/kg - N° CAS 104653-34-1. CLASSEMENT : Toxicité spécifique pour certains organes cibles. Exposition répétée (catégorie 2), Danger pour le milieu aquatique - Toxicité chronique (catégorie 3)

PRODUITS RÉSERVÉS AUX PROFESSIONNELS. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.