



APPÉTENCE REMARQUABLE SUR RATS NOIR



EXCELLENTE
APPÉTENCE



SPÉCIAL RAT NOIR



FABRIQUÉ
EN FRANCE

Découvrez
LE PROCESS
en vidéo



Le processus de fabrication de
LIPHATECH

EXCELLENTE TEXTURE

Grâce à un dosage précis des ingrédients, la pâte est fraîche et non collante.

- Relargage limité des matières grasses
- Excellente tenue dans le temps
- Manipulation propre

RECETTE SPÉCIFIQUE

La pâte comprend notamment des matières grasses d'origine 100% végétale. Ces matières grasses agissent comme exhausteur de goût : elles augmentent l'intensité olfactive gustative de l'appât et le rendent ainsi encore plus appétent.



LIEUX SECS

Sachet poreux qui laisse diffuser l'odeur céréalière

LA SOLUTION POUR LUTTER

- ▶ Contre les Rats Noirs
- ▶ A l'intérieur des bâtiments, en lieux secs ou protégés
- ▶ Sur des sites avec une forte compétition alimentaire

LE PRODUIT



Stockage
SÉCURISÉ



Utilisation obligatoire en POSTE D'APPÂTAGE

RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT	GENCOD	PEREMPTION	PAL
80005296	Seau de 5 Kg Sachet de 10g	3495692012962	2 ans	80 seaux

CONSEILS - BONNES PRATIQUES



AVANT LE TRAITEMENT : rendre inaccessibles les sources de nourriture



MISE EN PLACE DU TRAITEMENT



- Bien lire les indications et instructions sur les étiquettes du produit avant utilisation
- Placer les appâts dans des **postes d'appâtage sécurisés**
- Ne pas poser le poste d'appâtage dans un angle afin que le rongeur puisse toujours voir la sortie.
- Positionner les postes d'appâtage au **plus près des indices de présences** (crottes, traces de passage...)



- 1 Le rongeur entre dans le poste d'appâtage.
- 2 Il consomme l'appât.
- 3 Il ressort et succombe 4 à 10 jours plus tard.

- Faire « **une ceinture de protection** » avec les postes, autour des bâtiments pour éviter que les rongeurs pénètrent à l'intérieur.

SUIVI DU TRAITEMENT



- Inspecter les postes d'appâtage au minimum tous les 2 à 3 jours si présence de souris et tous les 5 à 7 jours si présence de rats après le début du traitement, puis une fois par semaine tant que les appâts sont consommés.
- Recharger les postes d'appâtage avec la quantité d'appâts nécessaire dans le respect des doses d'emploi autorisées.

- Il est primordial de veiller à la **disponibilité de l'appât** (le bon produit à la bonne dose au bon endroit) de façon à cibler toute la population.

VIGILANCE ET OBSERVATION POUR EVITER TOUTE NOUVELLE INFESTATION



- Eliminer les refuges, couper les végétaux sur une largeur d'un mètre autour des bâtiments, tailler les arbres
- Enlever tout ce qui peut servir d'abri potentiel
- Faire les travaux nécessaires pour empêcher l'entrée et l'installation des rongeurs



Le port des gants est obligatoire à chaque étape du traitement.



Se laver les mains après chaque manipulation.

[Retrouvez tous nos tutos et vidéos sur BIAGRO.FR](#)

MENTIONS RÉGLEMENTAIRES :

Nom homologué : SUPERCAID® PAT' - AMM N°FR-2018-0027 - Bromadiolone à 50mg/kg - N° CAS 28772-56-7. CLASSEMENT : Toxicité pour la reproduction (catégorie 1B), Toxicité spécifique pour certains organes cibles. Exposition répétée (catégorie 1).
PRODUITS RODONTICIDES. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.