

Fiche info
BONNES PRATIQUES
by **LIPHATECH**

02
AVRIL 2025



Concerne
les **PRODUITS**
PROFESSIONNELS
de la gamme



ÉLIMINER LES RONGEURS EFFICACEMENT

- Les 10 Conseils de nos Experts -



Réaliser un diagnostic **complet** pour
n'oublier aucun **noyau de population** et
réaliser un plan de sanitation homogène

Voir
La Fiche Info n°1
Le Diagnostic :
étape clé



Mettre en place des mesures d'**hygiène** :
éliminer ou rendre inaccessibles les sources de nourriture



Obturer tous les points d'entrée des locaux sensibles
dans la mesure du possible



Faire un traitement choc

POURQUOI ?

- Pour faire **diminuer rapidement** les
populations de rongeurs

COMMENT ?

- En utilisant des produits BIAGRO® à base de
diféthialone pendant **tout le traitement curatif**.
La diféthialone se distingue par son efficacité à la
concentration de 25 ppm (concentration d'origine)
et par l'absence de résistance observée à ce jour





- Les 10 Conseils de nos Experts -

- ✓ Mettre une **quantité suffisante** d'appâts dans le respect des conditions et des doses d'emploi recommandées sur l'étiquette du produit
- ✓ Placer les appâts dans des **postes d'appâtage sécurisés** à proximité immédiate de l'endroit où l'activité des rongeurs a été observée (crottes, passages, zones sensibles, etc)
- ✓ **Enlever** les appâts **non consommés** à la fin du traitement

POURQUOI ?

- Pour se conformer à l'interdiction de l'appâtage permanent

- ✓ Utiliser **un seul produit** à la fois :
une même substance et une même formulation par zone

POURQUOI ?

- Pour ne pas créer de confusion et d'aversion alimentaire chez les rongeurs (qui peuvent les détourner des appâts)
- Pour faciliter le suivi de la consommation

- ✓ **Eviter** les produits **déconcentrés** :
un produit est dit déconcentré lorsque sa teneur en substance active a été diminuée par rapport à celle initiale dans le but d'éviter le classement reprotoxique lors du changement de classement des rodenticides anticoagulants en 2017

POURQUOI ?

- Parce que les produits déconcentrés favorisent la sélection des individus résistants (concerne surtout les appâts à base de **difénacoum** et de **bromadiolone**)

- ✓ Après traitement, éliminer les zones de refuge et tous abris potentiels, **observer et surveiller** pour réduire le risque de ré-infestation. Etre proactif

